

Publicado: Miércoles, 21 Febrero 2024 00:00

3. MEDICAMENTOS PARA EL ASMA. POSOLOGÍA Y DISPOSITIVOS PARA INHALACIÓN

MEDICAMENTO ^(a)	POSOLOGÍA (dispositivo ^(b) : dosis)	DISPOSITIVO(b): ficha técnica de marca
CI	Beclometasona	ICP: 1-2 inh, 2-4 veces al día ICP: Becl-Asma 50 ; Becl-Asma 100 ; Becloforte 250 ; Becotide 50 ; Soprobec 50 ; Soprobec 100 ; Soprobec 200 ; Soprobec 250
	Budesónida	ICP: 200-1.600 mcg, 2-4 veces al día IPS: 200-1.600 mcg, 1-2 veces al día NEB: 0,25 – 2 mg, 1-2 veces al día ICP: Budesonida Aldo-Unión 50 ; Budesonida Aldo-Union 100 ; Budesonida Aldo-Unión 200 ; Budesonida Pulmictan Infantil 50 ; Budesonida Pulmictant 200 ; Ribujiet 200 IPS: Budesonida Easyhaler 100 ; Budesonida Easyhaler 200 ; Budesonida Easyhaler 400 ; Miflonide Breezhaler 200 ; Miflonide Breezhaler 400 ; Novopulm Novolizer 200 ; Novopulm Novolizer 400 ; Pulmicort Turbuhaler 100 ; Pulmicort Turbuhaler 200 ; Pulmicort Turbuhaler 400 NEB: Budena 0,25 ; Budena 0,5 ; Budesonida Aldo-Unión 0,25 ; Budesonida Aldo-Unión 0,5 ; Pulmicort 0,25 ; Pulmicort 0,50
	Ciclesonida	ICP: 160-320, 1-2 veces al día ICP: Alvesco 160
	Fluticasona	ICP, IPS: niños: 50-100 mcg, 2 veces al día adultos: 100-1.000 mcg, 2 veces al día NEB: 0,25-2 mg, 2 veces al día ICP: Flixotide 50 ; Flixotide 125 ; Flixotide 250 ; Flusonal 50 ; Flusonal 250 ; Fluticasona Cipla 125 ; Fluticasona Cipla 250 ; Inalacor 50 ; Inalacor 250 ; Trialona 50 ; Trialona 250 ; IPS: Flixotide Accuhaler 100 ; Flixotide Accuhaler 500 ; Flusonal Accuhaler 100 ; Flusonal Accuhaler 500 ; Inalacor Accuhaler 100 ; Inalacor Accuhaler 500 ; Trialona Accuhaler 100 ; Trialona Accuhaler 500 NEB: Fluticasona Aldo-Unión 0,25 ; Fluticasona Aldo-Unión 1
	Mometasona	IPS: 200-400 mg, 1-2 veces al día IPS: Asmanex Twisthaler 200 ; Asmanex Twisthaler 400 ;
SABA	Salbutamol	ICP: a demanda: 1-2 inh (máx: 8 inh/día) IPS: a demanda: 1-2 inh (máx: 2 inh/6-8 h) NEB: 1 inh/6-8 h (según presentación) ICP: Salbutamol Aldo-Unión 100 ; Salbutamol Sandoz 100 ; Ventoaldo 100 ; Ventolin 100 IPS: Salbutamol Clickhaler 114 NEB: Salbuair 2,5 - 5 ; Ventolin 5
	Terbutalina	IPS: a demanda; 1-3 inh (máx: 12 inh/día) IPS: Terbasmin Turbuhaler 500
SAMA	Ipratropio	ICP: a demanda; 2 inh/6 h (*) NEB: niños (250 mcg): 1 envase /6-8 h adultos (500 mcg): 1 envase /6-8 h ICP: Atrovent 20 (*) ; Atroaldo (*) ; Ipratropio bromuro Cipla (*) NEB: Atrovent 250 ; Atrovent 500
SABA/SAMA	Salbutamol / Ipratropio	NEB: 1 envase, 3-4 veces al día(*) NEB: Combiprasal 0,5/2,5(*)
LABA (#)	Formoterol (#)	ICP: 1 inh /12 h (máx: 2 inh/12 h) IPS: 1-2 inh/12-24 h (según marcas) ICP: Broncoral Neo 12 IPS: Foradil Aerolizer 12 ; Formoterol Aldo-Unión 12 ; Formoterol Stada 12 ; Formatris Novolizer 12 ; Oxis Turbuhaler 4,5 ; Oxis Turbuhaler 9
	Salmeterol (#)	ICP: 2 inh/12 h (máx: 4 inh/12 h) IPS: 1 inh/12 h (máx: 2 inh/12 h) ICP: Beglan 25 ; Betamican 25 ; Inspir 25 ; Serevent 25 ; Soltel 25 IPS: Beglan Accuhaler 50 ; Betamican Accuhaler 50 ; Inspir Accuhaler 50
LAMA	Tiotropio	IPS: 1 cápsula para inh/24 h (*) IVS: 1 dosis (2 pulsaciones)/24 h IPS: Braltus (*) ; Gregal (*) ; Spiriva (*) ; Sirkava (*) ; Tavulus (*) IVS: Spiriva Respimat 2,5
CI / SABA	Salbutamol / Beclometasona	ICP: 2 inh/12-24 h (máx: 2 inh/6-8 h) ICP: Ventoduo 100/50
CI / LABA	Formoterol / Beclometasona	ICP: 1-2 inh/12 h (máx: 4 inh/24 h) IPS: 2 inh/12 h (máx: 4 inh/24 h) ICP: Formodual 100/6 ; Formodual 200/6 ; Foster 100/6 ; Foster 200/6 IPS: Formodual Nexthaler 100/6 ; Formodual Nexthaler 200/6 ; Foster Nexthaler 100/6 ; Foster Nexthaler 200/6
	Formoterol / Budesónida	ICP: Rilast®: 1-2 inh/12 h; Symbicort®: 1-2 inh/12 h IPS: 1-2 inh/12 h ICP: Symbicort 80/2,25 ; Rilast 160/4,5 IPS: Budesonida/Formoterol Cipla 160/4,5 ; Budesonida/Formoterol Cipla 320/9 ; Bufomix Easyhaler 160/4,5 ; Bufomix Easyhaler 320/9 ; BiResp Spiromax 160/4,5 – 320/9 ; DuoResp Spiromax 160/4,5 - 320/9 ; Gibiter Easyhaler 160/4,5 ; Gibiter Easyhaler 320/9 ; Rilast Turbuhaler 80/4,5 ; Rilast Turbuhaler 160/4,5 ; Rilast Forte Turbulaher 320/9 ; Symbicort Turbuhaler 80/4,5 ; Symbicort Turbuhaler 160/4,5 ; Symbicort Forte Turbuhaler 320/9
	Formoterol / Fluticasona	ICP: 2 inh/12 h ICP: Flutiform 250/10 ; Flutiform 125/5 ; Flutiform 50/5

Publicado: Miércoles, 21 Febrero 2024 00:00

	Salmeterol / Fluticasona	ICP: 1-2 inh/12 h IPS: 1-2 inh/12 h	ICP: Anasma 25/50 – 25/125 – 25/250 ; Inaladuo 25/50 – 25/125 – 25/250 ; Salmeterol/Fluticasona Cipla 25/125 – 25/250 CP: Anasma 25/50 – 25/125 – 25/250 ; Inaladuo 25/50 – 25/125 – 25/250 ; IPS: Airflusal Fospiro 50/250 - 50/500 ; ; Anasma Accuhaler 50/100 - 50/250 - 50/500 ; Amaira 50/100 - 50/250 ; Amaira 50/500 ; BroPair Spiromax 12.75/100 – 12.75/202 ; Flusamix Easyhaler 50/500 ; Inaladuo Accuhaler 50/100 – 50/250 – 50/500 ; Inhalok Airmaster 50/250 – 50/500 ; Plusvent Accuhaler 50/100 – 50/250 - 50/500 ; Salmeterol/Fluticasona Cipla 50/250 – 50/500 ; Seffalair Spiromax 12.75/100 – 12.75/202 ; Seretide Accuhaler 50/100 – 50/250 – 50/500
	Indacaterol / Mometasona	IPS: 1 inh/24 h	IPC: Ateectura Breezhaler 125/62,5 – 125/127,5 – 125/260 ; Bemrist 125/62,5 – 125/127,5 – 125/260
	Vilanterol / Fluticasona	IPS: 1 inh/12-24 h	IPS: Relvar Ellipta 92/22-184/22 ; Revinty 92/22 – 184/22
CI / LABA / LAMA	Formoterol / Glicopirronio / Beclometasona	ICP: 2 inh/12 h IPS: 2 inh/12 h	ICP: Trimbow 87/5/9 y 172/5/9 ; Trydonis 87/5/9^(*) IPS: Trimbow 88/5/9 ; Trydonis 88/5/9^(*)
	Indacaterol / Glicopirronio / Mometasona	IPS: 1 inh/24 h	IPS: Energair Breezhaler 114/46/136 ; Zimbus Breezhaler 114/46/136 ;

(a) **CI** = GCI (corticoesteroides inhalados o glucocorticoides inhalados);
CS (corticoesteroides sistémicos);
LABA (broncodilatadores adrenérgicos beta-2 de acción larga) por inhalación;
LAMA (broncodilatadores anticolinérgicos – o antimuscarínicos- de acción larga) por inhalación;
SABA (broncodilatadores adrenérgicos beta-2 de acción corta) por inhalación;
SAMA (broncodilatadores anticolinérgicos – o antimuscarínicos- de acción corta) por inhalación.

(b) Dispositivos: **ICP** (inhalador de cartucho presurizado); **IPS** (inhalador de polvo seco); **IVS** (inhalador de vapor suave o de niebla fina); **NEB** (nebulizador).

(*): No indicados para asma en ficha técnica, pero se han incluido por su amplio uso y aceptación por las guías de práctica clínica.
(#): En asma, nunca se deben utilizar los LABA en monoterapia.

Abreviaturas. **h:** hora; **inh:** inhalación.



Publicado: Miércoles, 21 Febrero 2024 00:00
