



BIBLIOGRAFÍA

- SIGN. Diagnosis and management of epilepsy in adults. SIGN 143. 2015
- NICE. Epilepsies: diagnosis and management. CG137. 2012 (updated: February 2016).
- Epilepsy Society. NICE guidelines on anti-epileptic drugs. 2014.

Los algoritmos se basan en las evidencias y recomendaciones de la bibliografía citada, adaptadas a las circunstancias de nuestro medio.

Uso de antiepilépticos según la edad del paciente

Carbamazepina Fenitoína Fenobarbital	Dosis por kg de peso (sin consideración de edad)
Levetiracetam Valproico	A partir de 28 días (1 mes)
Vigabatrina	A partir de 10 kg de peso
Lamotrigina Topiramato	A partir de 2 años
Lacosamida	A partir de 4 años
Clobazam Etosuximida Gabapentina Oxcarbazepina Zonisamida	A partir de 6 años
Perampanel(#) Tiagabina	A partir de 12 años
Brivaracetam (#)	A partir de 16 años
Eslicarbazepina(#) Pregabalina Retigabina(#)	A partir de 18 años (adultos)

(#): autorizados en España exclusivamente para uso concomitante

BIBLIOGRAFÍA

- AEMPS. CIMA. Fichas técnicas. 2016.