

Formato de antibióticos

La AEMPS ha publicado una actualización relativa a los [cambios realizados en el formato de antibióticos](#), ajustando el tamaño de los envases de forma gradual, a las pautas recomendadas por la Guía Terapéutica Antimicrobiana del SNS (Guía PRAN) y la evidencia actual. Contiene el listado de envases de antibióticos que se adaptarán, así como información dirigida a profesionales sanitarios, médicos, farmacéuticos y odontólogos y un apartado de información al paciente.

Fracturas y bifosfonatos

Se ha publicado en la revista *BMJ* un estudio observacional sobre [fracturas y prescripción de bifosfonatos durante 3 y 5 años](#), que analiza si la interrupción del tratamiento con ácido alendrónico y risedrónico tras 3 o 5 años de tratamiento se asocia con cambios en el riesgo de fracturas por fragilidad, así como con la incidencia de fractura femoral atípica y osteonecrosis de los maxilares, con un seguimiento de hasta dos años. Se concluye que la interrupción del tratamiento no se asocia con un incremento en el riesgo de fracturas por fragilidad y que la incidencia de fractura femoral atípica es poco frecuente, y rara en el caso de osteonecrosis de los maxilares.

Benzodiazepinas e hipnóticos Z durante el embarazo y trastornos psiquiátricos en niños

BMJ ha publicado estudio realizado en población coreana, que evalúa la [asociación entre la exposición intrauterina a benzodiazepinas e hipnóticos-Z y el riesgo de trastornos psiquiátricos en la descendencia](#). Tras realizar diferentes ajustes, los autores concluyen que no se puede descartar esta posible asociación, siendo necesario la realización de más estudios.