

Noticias de interés farmacoterapéutico.

Enfermedad celíaca

El Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud ha actualizado el [Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca](#), que revisa su diagnóstico, tratamiento, seguimiento y transición a la atención adulta. El único tratamiento eficaz consiste en seguir una dieta estricta sin gluten de por vida. Recoge recomendaciones para las deficiencias nutricionales y de tratamiento para la osteopenia y osteoporosis e incluye el tratamiento de la enfermedad celíaca refractaria. Las nuevas estrategias terapéuticas, como la reducción de la disponibilidad del gluten en la luz intestinal, la modulación de la respuesta frente al gluten y la inflamación intestinal o la inducción de tolerancia al gluten mediante vacunas, se encuentran en su mayoría en fases experimentales.

Fertilidad

BMJ ha publicado un [resumen de la actualización de la guía NICE sobre evaluación y tratamiento de los problemas de fertilidad](#). Recomienda ampliar el estudio tras un año intentando concebir o seis ciclos de inseminación artificial, y derivar desde la primera consulta si existe una causa conocida o sospechada o a partir de los 36 años. En la infertilidad sin causa identificada, aconseja intentar concebir durante dos años antes de recurrir a la inseminación intrauterina o la fecundación in vitro (FIV); cuando se utiliza inseminación artificial, recomienda 12 ciclos de inseminación intrauterina antes de la FIV, salvo contraindicación. También se revisan, entre otros aspectos, la endometriosis, la valoración de la reserva ovárica y del factor masculino y la preservación de la fertilidad, y se incluye un resumen visual.

Agonistas del receptor de GLP-1 y alopecia

BMJ ha publicado un estudio observacional que analiza la asociación entre el [uso de arGLP-1 y el riesgo de alopecia en adultos con diabetes tipo 2](#), en comparación con los iSGLT-2 y los iDPP-4. Los arGLP-1 se asociaron con una mayor incidencia de alopecia registrada clínicamente, principalmente no cicatricial, frente a ambos comparadores. Aunque el riesgo absoluto fue bajo, este posible efecto adverso puede considerarse en la toma de decisiones compartida con los pacientes.



Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos

www.cadime.es

Nota: algunos artículos pueden requerir acceso institucional al texto completo a través de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA) u otros recursos suscritos.