

Noticias de interés farmacoterapéutico.

Beneficio de los betabloqueantes tras infarto de miocardio

En la revista *The New England Journal of Medicine* se ha publicado un metaanálisis sobre el beneficio del [uso de betabloqueantes tras infarto de miocardio en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo](#) preservada. Incluyendo 17801 pacientes, se concluye que el tratamiento con betabloqueantes, sin otra indicación, no reduce la incidencia de infarto de miocardio (HR 0,89; IC95% 0,77-1,03), la insuficiencia cardíaca (HR 0,87; IC95% 0,64-1,19) ni la mortalidad por todas las causas (HR 1,04; IC95% 0,89-1,21).

Vacunas contra el COVID-19, virus respiratorio sincitial y gripe

The New England Journal of Medicine ha publicado una revisión sistemática sobre la [evidencia actualizada de la eficacia o efectividad, y seguridad de las vacunas contra el COVID-19, virus respiratorio sincitial y la gripe para el periodo 2025-2026](#). Se sintetiza la evidencia de las vacunas comercializadas en USA en población adulta, pediátrica, embarazadas, inmunocomprometidos y mayores de 65 años, concluyéndose que las inmunizaciones se asocian con una reducción sustancial del riesgo de hospitalización y enfermedad grave en todas las poblaciones.

Tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y riesgo de aborto

The British Journal of Psychiatry ha publicado un estudio caso-control sobre el [tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el riesgo de aborto](#). El estudio encontró que el tratamiento se asoció a un mayor riesgo de aborto espontáneo (OR 1,6; IC95% 1,41-1,83), siendo el metilfenidato, la atomoxetina y la lisdexanfetamina los de mayor riesgo. Se indica la necesidad de más estudios sobre esta asociación.