

Noticias de la semana 16^a de 2024

Estatinas y riesgo de diabetes

En *Lancet Diabetes Endocrinology* se ha publicado [un metanálisis de datos individuales sobre efectos del tratamiento con estatinas sobre el diagnóstico de diabetes de nueva aparición y el empeoramiento de la glucemia en ensayos aleatorizados a gran escala con estatinas](#), que incluye 19 ensayos (123.940 participantes). Se observó un aumento del riesgo de diagnóstico de diabetes, tanto para las estatinas de baja y moderada intensidad (RR 1,10; IC95%:1,04-1,16), como para las de alta intensidad (RR 1,36; IC95% 1,25-1,48).

Lupus eritematoso

La revista *JAMA* ha publicado una revisión sobre [lupus eritematoso sistémico](#), que ofrece información sobre fisiopatología, presentación clínica, evaluación, diagnóstico y pronosis. En cuanto al tratamiento, la hidroxicloroquina se sitúa como tratamiento de primera línea y como alternativas se citan: azatioprina, micofenolato de mofetilo, ciclofosfamida, belimumab, voclosporina y anifrolumab.

Género y estatinas

En la revista *Heart* se ha publicado un estudio sobre las [diferencias de sexo en la intensidad de las prescripciones iniciales de estatinas en atención primaria](#). Se evaluaron 82.714 nuevos usuarios de estatinas, en atención primaria de los Países Bajos, apreciándose que existe una menor probabilidad de recibir una prescripción de estatinas de alta intensidad en mujeres, tanto en pacientes sin enfermedad cardiovascular (RR 0,69; IC95%: 0,63-0,75) como en aquellas con antecedentes (RR 0,77; IC95%: 0,74-0,81).