

Publicado: Martes, 18 Mayo 2021 00:00

---

## **Combinar vacunas diferentes contra el COVID-19: datos preliminares de seguridad.**

La revista [Lancet](#) ha publicado los [datos preliminares de reacciones a la vacunación heteróloga \(dosis 1ª y 2ª de diferentes vacunas\) de la COVID-19](#). Los datos proceden del estudio *Com-COV* realizado en 830 participantes, del que también se ha publicado un resumen en el [BMJ](#). Se trata de un estudio aleatorizado, multicéntrico con participante enmascarado, que ha comparado la combinación de dosis de las vacunas de AstraZeneca (ChAd) y Pfizer (BNT) (pautas heterólogas), frente a la administración de las dos dosis de la misma vacuna (pautas homólogas). Los resultados muestran que las dos pautas de vacunación heteróloga indujeron una mayor reactividad sistémica después de la 2ª dosis respecto a las pautas de vacunación homólogas. Como ejemplo, las notificaciones de fiebre fueron:

- Pauta heteróloga ChAd 1ª + BNT 2ª: 37 (34%) de 110 vacunados
- Pauta homóloga ChAd 1ª y 2ª dosis: 11 (10%) de 112 vacunados
- Pauta heteróloga BNT 1ª + ChAd 2ª: 47 (41%) de 114 vacunados
- Pauta homóloga BNT 1ª y 2ª dosis: 24 (21%) de 112 vacunados

Se observaron diferencias similares respecto a escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, dolor articular, malestar y dolor muscular; con notificaciones superiores para las dos pautas de vacunación heteróloga. Los resultados inmunológicos se prevé que estén disponibles en junio de 2021.