

Denosumab y fracturas postratamiento// Señales y alertas de seguridad
// Problemas neurológicos sospechosos.

Noticias de la semana 24^a de 2019:

Riesgo de fracturas vertebrales tras suspender el tratamiento con denosumab

La AEMPS ha emitido una Nota Informativa sobre el [riesgo de fracturas vertebrales múltiples tras la suspensión del tratamiento con denosumab](#). De acuerdo a las notificaciones de casos y la información disponible sobre el tema, la AEMPS recomienda utilizar denosumab sólo en pacientes con riesgo elevado de fracturas, en el contexto de las indicaciones autorizadas; informar a los pacientes de que no suspendan el tratamiento sin consultar con su médico; y si se suspende éste, mantener una vigilancia estrecha del paciente.

Alertas de seguridad de medicamentos 2017-2018

El boletín *Infac* ha publicado un artículo titulado [“Seguridad de medicamentos: señales y alertas generadas en 2017-2018”](#). Se recogen las comunicaciones de seguridad relativas a fármacos ampliamente utilizados (metamizol, hidroclorotiazida, fluoroquinolonas), otras relacionadas con los procesos de fabricación (sartanes, nitrosaminas), fármacos preventivos (denosumab), fármacos para el dolor (fentanilo, gabapentina), antidiabéticos (inhibidores SGLT2, incretinas, gliptinas) y otros.

Problemas neurológicos sospechosos: signos y síntomas.

Se ha publicado una guía NICE sobre [problemas neurológicos sospechosos: reconocimiento y evaluación](#). El documento presenta una relación de signos y síntomas que podrían ser indicativos de un problema neurológico importante (agrupados en pacientes menores y mayores de 16 años) con el enfoque de ayudar a los profesionales a realizar una evaluación inicial y valorar su derivación a atención especializada.



Fecha de última modificación: 12-06-2019