

Donepezilo y rabdomiolisis // Hipertensión en pacientes con asma //  
Guía de neumonía

## **Noticias de la semana 39 de 2019:**

### **Donepezilo: mayor riesgo de rabdomiolisis que rivastigmina o galantamina**

Se ha publicado un estudio de cohortes retrospectivo sobre: [Riesgo de rabdomiolisis con donepezilo comparado con rivastigmina o galantamina](#) realizado en Canadá de 2002 a 2017 en pacientes >65 años. El riesgo de ingreso hospitalario por rabdomiolisis en los 30 días posteriores al inicio del tratamiento, fue superior con donepezilo (n=152.300; 88 eventos; 0.06%) comparado con rivastigmina o galantamina (n=68.053; 16 eventos; 0.02%). En todos los casos la incidencia de rabdomiolisis fue baja y los casos graves muy infrecuentes, pero en pacientes con debilidad o dolor muscular, debería considerarse la sospecha.

### **Tratamiento de la hipertensión en pacientes con asma**

El **NEJM** ha publicado una revisión sobre el [Tratamiento de la hipertensión en pacientes con asma](#) que repasa los distintos grupos de antihipertensivos bajo la perspectiva del paciente con asma. También se revisan los fármacos utilizados para tratar el asma en pacientes con hipertensión.

### **Guía NICE de tratamiento de la neumonía en adultos**

Se ha publicado la actualización de la guía **NICE** sobre [Diagnóstico y tratamiento de la neumonía en adultos](#) que incorpora las recomendaciones sobre neumonía comunitaria y hospitalaria, de acuerdo a las evidencias posteriores más recientes.